

التربيـة غـير الفـطـرـية لـأـنـوـاع القـطـط البرـية الدـخـيلـة

جاكي ستريك

مركز تربية الحيوانات البرية العربية المعرضة للخطر، صندوق بريد ٢٩٩٢، الشارقة، breeding@epaa-shi.gov

مقدمة

يجب الامتناع عن التربية غير الفطرية للقطط البرية الدخيلة قدر الممكن. هنا يستطيع معظم المهتمين استبدال القدرات الغذائية المتوفرة في حليب الأم البديل أو التركيب وذلك لعدم امتلاكه تلك القدرات. إضافة إلى ذلك، يكون سلوك القط المربى طبيعياً مشابهاً لسلوك البالغين. وبالرغم من هذه الحقائق يوجد بعض الحالات ربما تكون فيها التربية الفطرية لقط الدخيل غير ممكنة. سيقدم الكاتب للقراء في المقالتين الأوليتين نظرة شاملة عن المعدات وأساليب الإدارة الأساسية من أجل التربية غير الفطرية للقطط البرية الدخيلة.

أ المعدات

يجب أن تكون الأوعية المستعملة من أجل القياس والمزج والتخزين للتركيبة المحضرة مباعدة وستستخدم لهدف التربية غير الفطرية فقط.

زجاجات التغذية

لقد أستخدمنا بنجاح الرضاعة الرئيسية (Catac-Ltd, UK. www.catac.co.uk) ST₂ بحملة Catac (Acinonyx jubatus) والنمور العربية (نمر مرقط أليف) وتكون زجاجة Catac بشكل موزي مصنوعة من زجاج مقوى ومتوفرة بمحجمين، الرضاعة القياسية (٤٠ مل) والرضاعة الرئيسية (٦٠ مل). وللحملة ثلاثة أحجام ST₂, ST₁, ST₂ صغيرة جداً حملة زجاجة الطفل الواضحة أن الحملة الأصغر ملائمة أكثر للقطط البرية الصغيرة. عندما تكون الحملة ST₂ صغيرة فهي تلائم دخول فم الطفل بشكل بسيط، تستخدم عادة في هذه الحالة حملة الخدج (الحملة اللبنية لحديثي الولادة) وتتوفر الزجاجات البلاستيكية بعلم صغيرة من PetAg Ltd, USA www.petag.com فهو يملك زجاجات احتياطية في حال كسرت إحداها.

ميزان للوزن

إن الميزان الدقيق هو عنصر أساسي في التربية غير الفطرية، والوزن المكتسب مؤشر على الصحة وتكون كمية التغذية معتمدة على النسبة المئوية من وزن جسم الوليد. يستخدم الميزان الالكتروني البسيتي مع وعاء الوزن المقعر للأطفال الرضع (حديثي الولادة) بينما يستخدم ميزان التعليق الريفي للكبار البالغين. يجب أن نزن الحيوان الرضيع يومياً بنفس التوقيت، بعد طرح الفضلات (البول والغائط) ولكن قبل أن تتم تغذيته.

المأوى (المسكن)

يمتلك مولود القط الرضيع قدرة ضبط حرارية ضعيفة فيفضل ان تكون درجة الحرارة بين ٣٢-٣٠ درجة مئوية في الأسبوع الأول، وثم تهبط تدريجياً فيما بعد إلى ٢٤ درجة مئوية. وينصح بجهاز الحضانة التجاري للاستخدام المبكر للطفل الرضيع، ويستخدم صندوقاً خشبياً بالمقاييس التالية ١٥ سم طول الجوانب العالية بالإضافة إلى غطاء تسخين يشغل نصف مساحة ارض هذا الصندوق بحيث يوضع غطاء تسخين في أخفض موضع ويغطي بواسطة طبقي أساس على الأرض. ويوضع وعاء مقعر من الماء بعيداً عن متناول يد الأطفال لخلق محيط رطب في المأوى، ويراعي في حجم هذا المأوى أن يلائم حركة وحرية التنقل للطفل الرضيع.

طبقة الأساس

استخدم أغطية صوفية أو مناشف. تلف طبقة الأساس مثل "Sausag" ويلوي في شكل حرف C ليقلد شكل الأم. يوضع الطفل الرضيع في داخلها أو يغطى بالقمash فوق "Sausag". مشعرين الطفل بأمان أكثر. يجب الامتناع عن استخدام فراء مزيف الذي يتسبب في بعض حالات الاقياء أو الإمساك. وفي حال حدوث ذلك يجب أن تبدل المناشف أو البطانيات الوسخة حالاً.

ب العناية الصحية

تطلب أهمية المعالجة الصحيحة وتخزين المواد وتعقيم جميع المعدات تأكيداً زائداً لأنها ستساهم في صحة الحيوان كل. أغسل يديك بصابون مبidi للجراثيم قبل التعامل مع الطفل الرضيع ومعدات التغذية. إن تعقيم المعدات هو شئ هام جداً. ينصح بالمنتجات التجارية المتضمنة Sodium Dichloroisocyanurate "Steri tabs" or "Milton" لتعقيم زجاجة الطفل. يجب أن تحضر هذه السوائل تبعاً لتعليمات المنتجين.

- حضر التركيب ونظف الزجاجات في بيئة صحية نظيفة
- يجب أن تغسل المعدات في ماء معقم (صابوني) دائم بعد كل استعمال.
- استخدام فرشاة الزجاجة لتنظيف داخل زجاجة التغذية.

- تشطف معدات الكفالة باتقان تحت الماء الجاري قبل وضعها في سائل التعقيم. أغسل يديك بصابون مبidi للجراثيم قبل تحريك الزجاجة والحملة من سائل التعقيم بعد ذلك أغسل الزجاجة والحملة تحت صنبور الماء الجاري لإزالة سائل التعقيم.

ت ٠٠ سجل الحفظ

تكون الصفحة الرئيسية هي صفحة بيانات الطفل الرضيع للتسجيلات اليومية لجميع معلومات التربية غير الفطرية. حيث تسمح لك تلك البيانات المدونة في الصفحة بأن تستمر برصد أي تغيرات وتكون مرجعاً مفيداً لتجارب التربية الأولية المستقبلية. إن الوزن اليومي المكتسب المأخوذ عند كل ارضاع، وإخراج الفضلات (البول والغائط، اللون والتاسق) و العلاج المعطى والمراحل المتغيرة من التطور السلوكى والفيزيائى هي جميعها تفاصيل قيمة كي تسجل.



الشكل ١: وليد نمر عربي (نمر مرقط أليف) عمره ٢٨ يوماً.

ث ٠٠ الحجر الصحي

يجب أن تسكن الأطفال الرضيع بمotel عن الحيوانات الأخرى وذلك لإنقاص خطر العدوى. يجب أن يكون إذن الدخول إلى الطفل الرضيع محدوداً بالنسبة لهيئة الموظفين، المربى والطبيب البيطري. ويجب أن تكون الصداري و زوج الأحذية موضوعة جانباً لل باستخدام الفرد من المربى ومحفوظة عند مدخل السياغ . اعتماداً على النوع يجب أن يوجد التوازن بين الشفاط الاجتماعي والتجهزة الصحية المعزولة. بشكل عام يجب أن يكون الحجر الصحي كامل ودقيق بدون إتاحة فرص للاحتكاك واللعب.

ج ٠٠ الروتين

إن الروتين هو شئ هام جداً في حالة التربية غير الفطرية. حيث يجب أن يطعم المولود ويوزن بنفس الوقت كل يوم. وهذا ما يجعل الوليد يشعر بأمان أكثر. إن المحافظة على التغذية المتكررة وكميات التغذية المماطلة تقلل من فرص التثبات المعدى أو المعموى.

٠٠ التحضير الأولي

يجب أن تتضمن المعدات الأساسية للتقطط البرية غير الفطرية حلم رضاعة بحجم مناسب للقطط الصغيرة والكبيرة إضافة إلى زجاجات وتركيب مناسب. يخزن التركيب لتغذية طفل رضيع واحد، من أكبر نوع في المجموعة لمدة أسبوع واحد على الأقل في الثلاجة (ستة أشهر كحد أقصى) في وعاء تصنيف واضح، وسيسمح ذلك بتجهيز تركيبة أكثر بوقت كاف.

References

- AKF, (2005), Dedicated Cheetah Combined July/August 2005, Journal of the American Association of Zoo Keepers, 32(7/8)
Felid Taxonomic Advisory Group (TAG) of the American Zoo and Aquarium Association (AZA) • www.felidtag.org
Gage, L.J. (2002) Hand-rearing Wild and Domestic Mammals. Iowa State Press.
The Infant Diet Book. AZA Animal Health Committee. American Zoo and Aquarium Association • www.aza.org